

SRB Uputstvo za upotrebu

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da uzimate ovaj proizvod.
– Sačuvajte ovo uputstvo u slučaju da je potrebno da ga ponovo pročitate.
– Morate se obratiti svom lekaru ukoliko simptomi potraju i nema poboljšanja.

SABESP[®]

meke kapsule Medicinsko sredstvo

U ovom uputstvu pročitajte:

1. Šta je SABESP i čemu je namenjen
2. Kako se uzima SABESP
3. Kontraindikacije
4. Upozorenja i mere opreza
5. Moguća neželjena dejstva
6. Kako čuvati SABESP
7. Dodatne informacije

1 kapsula SABESP sadrži:

80 mg simetikona

Pomoćne supstance: želatin, glicerol, hinolin žuta

1. Šta je SABESP i čemu je namenjen

SABESP sadrži simetikon koji je stabilna mešavina silikonskog polimera i silikon dioksida koji poseduju osobinu da redukuju stvaranje pene i gasova u crevima. To je hemijski inertna supstanca. Simetikon se ne resorbuje iz gastrointestinalnog trakta, ne dovodi do promena u digestivnom sistemu ili promena u varenju, i ne ometa resorpciju u crevima. Njegov oblik ostaje nepromenjen prilikom izlučivanja iz tela. Simetikon smanjuje površinski napon sluzi i gasnih mehurića koji se nalaze u crevima i tako pomaže da se oni razbiju, što olakšava eliminaciju viška crevnih gasova. SABESP se koristi za ublažavanje simptoma prouzrokovanih gasovima koji se stvaraju u želucu i crevima tokom procesa probave, tokom koga dolazi do fermentacije sadržaja u crevima. Ovi simptomi uključuju nadimanje, flatulenciju (gasove) i podriganje, koji se javljaju usled loših navika u ishrani.

SABESP se takođe koristi kao pomoć pre dijagnostičkih ispitivanja abdominalne šupljine kod kojih se koriste tehnike slikanja, na primer radiološke, ultrazvučne i endoskopske. On doprinosi eliminaciji gasova i vazduha iz gastrointestinalnog trakta, čime se poboljšava kvalitet slika i uklanjaju poteškoće u postavljanju dijagnoze.

2. Kako se uzima SABESP

Proizvod je u obliku mekih želatinskih kapsula koje se moraju uzimati oralno. *Simptomi viška gasova u crevima: flatulencija (gasovi), nadimanje, podriganje.*

Osobe starije od 18 godina: 1 kapsula 3–4 puta tokom 24-časovnog perioda *Priprema za dijagnostička ispitivanja*

Jedan dan pre izvođenja testa: 1 kapsula 3 puta na dan, na dan izvođenja testa: 2 kapsule ujutru na prazan želudac.

Kapsule se mogu uzeti pre, tokom i nakon uzimanja hrane, i treba da se uzmu sa odgovarajućom količinom tečnosti (približno 1 čaša vode).

Ako propustite dozu, ne treba da uzimate duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Preporučena doza ne sme biti prekoračena.

Proizvod ne treba da se uzima nakon isteka roka važenja.

Simetikon
80 mg

3. Kontraindikacije

Ne smete uzimati SABESP ako ste alergični na simetikon ili na bilo koji sastojak ovog proizvoda.

4. Upozorenja i mere opreza

Morate se konsultovati sa svojim lekarom ako koristite ovaj proizvod tokom trudnoće i dojenja.

Ako simptomi potraju ili se pogoršaju i dobijete nove simptome povezane sa želucom ili crevima, treba da se konsultujete sa svojim lekarom kako biste utvrdili uzrok problema i dobili odgovarajući tretman.

Nije utvrđeno da simetikon izaziva značajne interakcije sa drugim lekovima; međutim, zbog mogućnosti interakcije, ne preporučuje se da uzimate SABESP dok uzimate druge lekove.

5. Moguća neželjena dejstva

Nisu prijavljena neželjena dejstva povezana sa upotrebom ovog proizvoda. Kod nekih osoba se povremeno mogu javiti bol u trbuhu, proliv i zatvor. Sva neželjena dejstva do kojih dođe kao posledica uzimanja ovog proizvoda treba da budu prijavljena proizvođaču.



6. Kako čuvati SABESP

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi koja ne prelazi 25° C, van vidokruga i domašaja dece.

7. Dodatne informacije

SABESP je dostupan u kutijama koje sadrže 25 mekih kapsula.

Informacije na pakovanju

	
	
	
<p>Datum revizije: mart 2018.</p>	<p>Proizvođač NTC S.r.l. Via Luigi Ranza 3 20124 Milano</p> <p>LFSIM01400</p>

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj proizvod.
- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete trebati da ga pročitate ponovo.
- Ako simptomi potraju i nema poboljšanja, morate se obratiti svom ljekaru.

SABESP®

meke kapsule Medicinsko sredstvo

Sadržaj uputstva:

1. Šta je SABESP i za šta se koristi
2. Kako trebate uzimati SABESP
3. Kontraindikacije
4. Upozorenja i mjere opreza
5. Moguća neželjena djelovanja
6. Kako čuvati SABESP
7. Dodatna informacije

1 kapsula SABESP sadrži:

80 mg simetikona
Dodatni sastojci: želatin, glicerol, hinolin žuta

1. Šta je SABESP i za šta se koristi

SABESP sadrži simetikon koji je stabilna mješavina polimera silikona i silicijum dioksida koji sadrži supstancu protiv pjenjenja i ima svojstva smanjivanja crijevnih gasova. To je hemijski inertna supstanca. Simetikon se ne apsorbuje u tijelu putem gastrointestinalnog trakta, ne izaziva nikakve promjene u probavnom sistemu ili varenju i ne ometa intestinalnu apsorpciju. Prilikom prirodnog izbacivanja iz tijela, njegov oblik ostaje nepromijenjen. Simetikon umanjuje površinsku napetost sluznice i mjehurića gasa koji se nalaze u crijevu i stoga pomaže u probijanju tih mjehurića gasa, što pomaže u eliminaciji viška gastrointestinalnog gasa. SABESP koristi se za ublažavanje simptoma izazvanih nakupljenim stomačnim i intestinalnim gasovima tokom digestivnog procesa, za vrijeme kojeg dolazi do fermentacije u crijevima. Ovi simptomi uključuju nadimanje, flatulenciju (gasove) i podrigivanje, koji se javljaju usled loših navika u ishrani. SABESP takođe se koristi kao pomoć prije dijagnostičkih ispitivanja trbušne šupljine, a koja se služe tehnikama snimanja, kao što su radiologija, ultrazvuk i endoskopija. On pridonosi eliminaciji gasova i vazduha iz gastrointestinalnog trakta, čime se poboljšava kvalitet snimaka i otklanjaju poteškoće prilikom postavljanja dijagnoze.

2. Kako trebate uzimati SABESP

Ovaj proizvod u obliku mekih želatinskih kapsula mora se uzimati oralno. *Simptomi viška intestinalnog gasa: flatulencija, nadimanje, podrigivanje.* Osobe starije od 18 godina: 1 kapsula, 3-4 puta u roku od 24 sata
Pripreme za dijagnostička ispitivanja
Dan prije pregleda: 1 kapsula 3 puta dnevno, na dan pregleda: 2 kapsule ujutro na prazan stomak.

Kapsule se mogu uzeti prije, za vrijeme ili nakon obroka i trebaju se uzeti uz odgovarajuću količinu tekućine (približno 1 čaša vode).

Ako propustite dozu, ne smijete naknadno uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.
Preporučena doza se ne smije prekoračivati.
Proizvod se ne smije uzimati nakon isteka roka upotrebe.

Simetikon
80 mg

3. Kontraindikacije

Ne smijete uzimati SABESP ako ste alergični na simetikon ili na bilo koji drugi sastojak sadržan u ovom proizvodu.

4. Upozorenja i mjere opreza

Ako ste trudni ili dojite zatražite od svog ljekara savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Ako se simptomi ne povuku ili postanu ozbiljniji, a vi dobijete nove simptome vezane za stomak ili crijeva, morate se obratiti ljekaru kako bi se utvrdio uzrok problema i odredilo odgovarajuće liječenje.

Nije utvrđeno da simetikon izaziva bilo kakve značajne interakcije s lijekovima; međutim zbog mogućnosti interakcije, ne preporučuje se uzimanje SABESP dok se uzimaju lijekovi.

5. Moguća neželjena djelovanja

Nije bilo prijavljenih neželjenih djelovanja vezanih za upotrebu ovog proizvoda. Neki korisnici mogu povremeno osjetiti bol u stomaku, imati dijareju, konstipaciju.

Sva neželjena djelovanja koja su se javila kao rezultat korištenja ovog proizvoda trebaju se prijaviti proizvođaču.

6. Kako čuvati SABESP

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi koja ne prelazi 25° C , van vidokrugla i dohvata djece.

7. Dodatna informacije

SABESP je dostupan u kutijama koje sadrže 25 mekih kapsula.

Informacije na pakovanju

